

## Consentimiento para una transfusión de derivados de la sangre

Etiqueta del paciente

La ley del estado de Nueva York le permite tomar decisiones sobre su atención médica. Su médico puede ayudarlo entregándole información, pero al final la elección es suya. Este documento explica los riesgos, beneficios y otras opciones si necesita una transfusión de sangre. Si tiene alguna pregunta sobre este documento, consulte a su médico.

### Plan de tratamiento propuesto

1. Mi médico recomienda una transfusión de sangre para ayudar a tratar mi condición de
2. Esto significa que podría recibir:
  - Glóbulos rojos para transportar oxígeno en mi cuerpo.
  - Plaquetas para ayudar a que mi sangre coagule.
  - Plasma, que es la parte líquida de la sangre, para ayudar con la coagulación.
  - Concentrados de factor para sustituir proteínas y ayudar a que mi sangre coagule.
3. Una transfusión de sangre puede mejorar mi condición. Mi médico piensa que ayudará a que mis niveles de sangre vuelvan a la normalidad.
  - Si recibo glóbulos rojos, esto debe ayudar a mi sangre a transportar más oxígeno a mi corazón y a otras partes de mi cuerpo.
  - Si recibo plaquetas, plasma o concentrados de factor, esto debe ayudar a que mi sangre coagule adecuadamente, reduciendo el riesgo de sangrado.
4. Una transfusión de sangre puede durar de 4 a 8 horas, dependiendo de la sangre que necesite.
5. Se me administrará mediante una aguja en mi brazo o mano. Si tengo una vía central, es posible que se use para administrar la sangre lentamente.

### Riesgos

1. La sangre que reciba viene del Centro de sangre de la Cruz Roja Americana (Centro de sangre). Le hacen pruebas minuciosas a la sangre para asegurarse de que sea equivalente a la mía y reducir las probabilidades de causar reacciones graves.
2. Los donantes dan sangre voluntariamente al Centro de sangre y los seleccionan usando prácticas seguras.
3. Es posible que algunas personas tengan una reacción a los derivados de la sangre, pero la mayoría de estas no son graves y se pueden tratar con medicamentos. Los síntomas frecuentes de una reacción incluyen fiebre, escalofríos, sarpullido y falta de aire.
4. Hay una pequeña probabilidad de tener una reacción más grave llamada reacción transfusional hemolítica que puede causar problemas médicos a largo plazo o poner en peligro la vida.
5. También hay una pequeña probabilidad de desarrollar problemas pulmonares causados por una transfusión, que pueden causar problemas médicos graves.
6. Aunque el Centro de Sangre sigue directrices de seguridad estrictas, hay un riesgo muy bajo de contraer una infección como hepatitis o VIH durante la transfusión.

*Continúa en la siguiente página.*





Etiqueta del paciente

### Consentimiento para una transfusión de derivados de la sangre

#### Alternativas

- 1. Hay otras opciones que no son recibir una transfusión de sangre, incluyendo la elección de rechazar una. Estas opciones incluyen:
  - Usar productos que no sean derivados de la sangre, como vitaminas, para ayudar a mi cuerpo a producir sangre.
  - Medicamentos para ayudar a que aumenten mis glóbulos sanguíneos.
  - Otros medicamentos para ayudar a mi sistema sanguíneo.
  - Elegir no recibir ningún tratamiento.
- 2. Estas otras opciones podrían no funcionar tan rápido ni tan bien como una transfusión de sangre.
- 3. Si rechazo una transfusión de sangre cuando necesite una, mi condición podría empeorar, lo que podría generar problemas graves para mi corazón u otros órganos, como un ataque cardíaco o un derrame cerebral.

#### Dar su consentimiento o rechazar recibir sangre o derivados de la sangre

Firmando este formulario, confirmo que entiendo los riesgos, beneficios y alternativas de recibir derivados de la sangre. Tuve la oportunidad de hacer preguntas y me las respondieron satisfactoriamente. Mi proveedor me explicó que necesito una transfusión antes de que me administraran sangre o derivados de la sangre. Sé que puedo rechazar el tratamiento o detenerlo en cualquier momento sin afectar mi capacidad de acceder a servicios de atención médica. También tengo derecho a pedir un intérprete. Me entregaron la información en un idioma que entiendo.

Se usó un intérprete  SÍ  NO

Marque una casilla, luego firme y feche abajo:

- DOY MI CONSENTIMIENTO** para recibir la transfusión de sangre descrita arriba.
- ME NIEGO** a recibir la transfusión de sangre descrita arriba.

FIRMA DEL MÉDICO	FECHA	HORA
FIRMA DEL PACIENTE/OTRA PERSONA LEGALMENTE RESPONSABLE	FECHA	HORA
RELACIÓN DE LA PERSONA LEGALMENTE RESPONSABLE CON EL PACIENTE	FECHA	HORA
FIRMA DEL TESTIGO	FECHA	HORA

